

## Ringegrænser, Klinisk Biokemisk afdeling, Randers

Analyse	Enhed	Mindre end <	Større end >	Rekvirent	Ny / Altid
P-Calcium (total)	mmol/l	1,80	3,00	Alle	Ny
P-Calcium-ion (fri, pH 7,40)	mmol/l	0,75	1,50	Alle	Ny
P-Carbamid	mmol/l		35	Praksis	Ny
P-Creatinin	µmol/l		500	Praksis	Ny
P-Digoxin	nmol/l		3,0	Alle	Altid
P-Glucose (alle typer)	mmol/l	2,5	20	Alle	Altid
B-Hæmoglobin (Fe)	mmol/l	4,0		Alle	Ny
P-Kalium	mmol/l	2,5	6,0	Alle	Altid
P-Koagulationsfakt. II, VII, X (AK-beh.) (INR)	INR		5,0	Alle	Altid
P-Koagulationsfakt. II, VII, X (diagn) (PP)	arb.enh.	0,06		Alle	Altid
B-Leukocytter (total)	mia/l	1,0	50	Praksis	Ny
P-Lithium	mmol/l		1,50	Alle	Altid
P-Magnesium	mmol/l	0,40		Alle	Ny
P-Natrium	mmol/l	120	160	Alle	Ny
B-Neutrofilocytter	mia/l	0,8		Alle	Ny
P-Paracetamol	µmol/l		1300	Alle	Altid
P-Salicylat	mmol/l		2,2	Alle	Altid
B-Thrombocytter	mia/l	25		Alle	Ny
P-Triiodthyronin (Total T3)	nmol/l		6,0	Praksis	Ny
P-Thyroxin (Total T4)	nmol/l		300	Praksis	Ny
P-Valproat	µmol/l		1300	Alle	Altid

**Alle:** Ringes til alle rekvirenter.

**Praksis:** Ringes kun, hvis rekvirenten er en praktiserende læge.

Telefonsvarafgivelse afhænger af, om analyseresultatet er nyt, som det fremgår af kolonnen "ny/alle" i tabellen, idet:

**Altid:** Ringes altid.

**Ny:** Kun nyopdagede ringes ud. Det vil sige, at der ikke skal ringes, hvis analyseresultatet vurderes at være i samme niveau, som tidligere analyseresultat (i tvivlstilfælde konfereres med læge eller der ringes ud).

den 28-01-2011