

P - Anti-ekstraherbart nucl. antig. (anti-ENA)

Arbitrær stofkonc.

NPU 12 022; ENA

Indikation

Formodning om systemisk lupus erythematosus eller mixed connective tissue disease. Udredning af kronisk inflammatoriske reumatiske sygdomme med alveolitis og/eller tegn på myositis kombineret med Raynauds fænomener. Udredning af middel/stærkt positiv ANA af plettet type, mønster 8.

Prøvemateriale

Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)

Analysemateriale

7 ml blod uden tilsætning eller 3 ml serum

Forsendelse

Materialet sendes med almindelig post

Laboratorium

Statens Serum Institut, København

Svartid

2 - 4 dage

Referenceinterval

Se svar fra SSI

Fortolkning

Positiv hos alle patienter med mixed connective tissue disease, i reglen med titre > 3.200.

Positiv ved systemisk lupus erythematosus hos ca 30 % af patienterne, hyppigst hos en gruppe der har alveolitis eller tegn på myositis samt Raynauds fænomener og positiv IgM-RF. Titrene er her som regel < 3.200.

Kan endvidere findes positiv ved reumatoid arthritis og polymyositis/dermatomyositis samt sklerodermi.

Se også www.ssi.dk

Godkendt: 01-08-2007

