

P - Bilirubin-Albumin

Stofkoncentration (µmol/L)

NPU 01 367; Delta-Bilirubin; Kovalent proteinbundet bilirubin

Indikation	Mistanke om medfødt galdestase. Udredning af lever- og galdevejs-sygdomme.
Prøvemateriale	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
Analysemateriale	2 ml serum Prøvematerialet skal beskyttes mod lys.
Forsendelse	Afpipetteret serum med almindelig post
Holdbarhed	1 døgn ved 20°C; 7 døgn ved 4°C; 6 mdr ved -20°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
Referenceinterval	< 10 µmol/L Der findes særlige referenceintervaller for børn
Fortolkning	Forhøjede værdier ses efter sygdomsperioder med forhøjet P-Bilirubiner, glucoronider. Delta-Bilirubin elimineres med samme, relativt lange halveringstid som Albumin (2 - 3 uger), og dette kan være årsag til protraheret hyperbilirubinæmi og icterus.
Bemærkninger	Summen af P-Bilirubin, glucoronider og P-Bilirubin-albumin svarer til det, man i ældre litteratur kalder "direkte reagerende bilirubin".

Godkendt: 01-08-2007

