

P - Clobazam

Stofkoncentration (nmol/L)

NPU 03 932; Frisium

Indikation

Terapikontrol 1 uge og 3 uger efter påbegyndt behandling. Hvis man alene vil forfølge en mistanke om misbrug af stoffet bør der i stedet rekvireres U-Medikamenter (se denne).

Patientforberedelse

Patienten skal evt instrueres om at vente med morgenmedicinen, indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks. Laboratoriet vil gerne have oplysninger om al medicinindtagelse, for at kunne tage højde for eventuel interferens i analysen.

Prøvemateriale

Blod i glas uden antikoagulans (tørglas). Gelglas kan ikke anvendes.

Analysemateriale

2 ml serum

Forsendelse

Afpipetteret serum med almindelig post

Holdbarhed

1 uge ved 20°C; 2 uger ved 4°C

Laboratorium

Laboratoriet, Epilepsihospitalet Dianalund

Svartid

Ca 7 dage

Terapeutisk interval

Vejledende 80 - 960 nmol/L

Fortolkning

Steady state opnås ca 7 døgn efter påbegyndt medicinering eller ændring i dosis. Nogle patienter metaboliserer stoffet langsomt, og en ekstra blodprøve efter 3 ugers behandling anbefales.

Godkendt: 01-08-2007

