

B - Coombs' direkte test

Arbitrær enhed (arb.enh.)

NPU 01 717; DAT; direkte antiglobulin test; Erythrocytbundet complement og/eller immunoglobulin; Anti-globulin-reaktion

Indikation

Mistanke om autoantistoffer i forbindelse med transfusionskomplikationer, autoimmune sygdomme og anæmier, eythroblastosis foetalis, samt ved reaktion på medikamina.

Prøvemateriale

Blod i EDTA-glas

Prøven skal forsynes med dato, og patientens navn og CPR-nr samt signatur for prøvetagning.

Analysemateriale

4 ml blod

Forsendelse

Blod med almindelig post

Holdbarhed

Ca 1 døgn ved 20°C; 4 døgn ved 4°C

Laboratorium

Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Svartid

1 – 2 dage

Referenceinterval

0 arb.enh.

Fortolkning

En positiv test ses fx ved autoimmun hæmolytisk anæmi og andre autoimmune sygdomme, ved erythroblastosis foetalis, hæmolytisk transfusionskomplikation, visse maligne blodsygdomme og som reaktion på indtagelse af visse medikamina. En positiv test kan i sjældne tilfælde ses hos tilsyneladende raske personer.

Godkendt: 03-09-2007

