

Ercs (B)- Erythrocytter, hæmoglobin F-holdige (FMH)

NPU 01 964; Føtomaternel blødning; FMH

Indikation	Undersøgelsen er indiceret ved mistanke om blødning fra foster til moder under graviditet eller i forbindelse med fødsel.
Patientforberedelse	Skriv venligst diagnose og patientens blodtype (hvis den kendt), samt barnets blodtype, vægt og hæmoglobin (hvis det er kendt). Der tages forbehold for resultatet, hvis blodtypen ikke er oplyst.
Prøvemateriale	Blod i CPD-rør Postforsendelse kan ikke ske på fredage og før hellidage.
Analysemateriale	Min 2 ml
Forsendelse	Materialet sendes med almindelig post
Holdbarhed	Højst 1 uge ved 4°C
Laboratorium	Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
Rekvissionseddel	Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby: Blodtypelaboratoriet, Vævstypelaboratoriet
Svartid	Ca 1 uge (analysen udføres på torsdage)
Referenceinterval	Se fortolkning
Fortolkning	Der undersøges for fraktionen af HbF i moderens blod. Fraktionen omregnes til ml blødning fra barn til mor. Mindre end 6 ml foetomaternel blødning skønnes ikke at have klinisk betydning og resultatet svares som < 6 ml. Hvis resultatet er > 6 ml gives resultatet som et eksakt antal ml.

Godkendt: 01-08-2007

