

**P - Gentamicin**

Massekoncentration (mg/L)

NPU 05 504; Garamycin; Gensumycin; Gentacoll; Hexamycin; Septopal

<b>Indikation</b>	Der er altid indikation for at måle serumkoncentrationen hos patienter i behandling mere end 5 dage eller med påvirket nyrefunktion.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
<b>Analysemateriale</b>	2 ml serum
<b>Forsendelse</b>	Afpipetteret serum med kurér (portør, taxi etc)
<b>Holdbarhed</b>	5 døgn ved 4°C; 1 md ved -20°C
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
<b>Rekvissionseddel</b>	Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby: Bakteriologisk afsnit (brun seddel i A5-format)
<b>Svartid</b>	Samme dag, hvis prøven tages på morgenrunden og er på Mikrobiologisk afdeling inden kl 13. Analysen udføres ikke på søndage, med mindre der træffes en særaftale med laboratoriet.
<b>Referenceinterval</b>	Se svarseddel
<b>Fortolkning</b>	Se svaret og vejledningen fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
<b>Bemærkninger</b>	Husk at angive tidspunktet for prøvetagning og sidste dosis af stoffet. Angiv også hvis patienten får andre antibiotika og i givet fald hvilke. Der må ikke tages blod fra intravenøse katetere, som også anvendes til indgift af stoffet.

Godkendt: 01-08-2007

