

**P - Glat muskel antistof**

Arbitrær enhed (arb.enh.)

NPU 02 850; Smooth muscle antibody; SMA

<b>Indikation</b>	Formodning om kronisk aggressiv hepatitis.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
<b>Analysemateriale</b>	5 ml blod eller 2 ml serum  5 ml blod eller 2 ml serum er tilstrækkeligt, uanset om der rekvireres én eller flere undersøgelser. Overskydende serum nedfryses, så supplerende undersøgelser kan rekvireres efterfølgende.
<b>Forsendelse</b>	Blod eller afpipetteret serum med almindelig post
<b>Laboratorium</b>	Statens Serum Institut, København
<b>Svartid</b>	7 dage (udføres 2 gange om ugen)
<b>Referenceinterval</b>	0 arb.enh.
<b>Fortolkning</b>	<p>Stærkt positive resultater ses især ved kronisk aggressiv hepatitis og biliær cirrose. Middel eller svagt positiv ved en række kronisk inflammatoriske sygdomme, akut hepatitis, infektiøs mononukleose og hos nogle patienter med maligne sygdomme.</p> <p>Svagt positiv hos 7 % af raske personer.</p> <p>Ved kronisk aggressiv hepatitis er SMA især rettet mod actin.</p> <p>Se evt.: <a href="http://www.ssi.dk">www.ssi.dk</a></p>

Godkendt: 01-08-2007

