

Hb(B) - Hemoglobin, fraktioneret

NPU 02 326; Thalassæmi; Hæmoglobin A, -A2, -Barts, -C, -D, -E, -F, -H og -S

Indikation	Mistanke om hemoglobinopatier.
Prøvemateriale	Blod i EDTA-glas
Analysemateriale	4 ml blod
Forsendelse	Blod med kurér (portør, taxi etc)
Holdbarhed	2 døgn ved 20°C; 7 døgn ved 4°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade
Fortolkning	<p>Resultatet ledsages af tekstsvar.</p> <p>Det anbefales at kontakte Hemoglobinopaticentret, Hæmatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital ved mistanke om hemoglobinopati. Det er især aktuelt hos anæmiske patienter med etnisk oprindelse i Middelhavslandene, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika.</p> <p>Se også Pt-alfa- og -beta-Globin, genetiske defekter. Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade.</p>
Bemærkninger	Der udføres en HPLC-fraktionering af hemoglobin. Analysen kan både afsløre kvantitativt abnorme fordelinger af hemoglobinfraktioner (fx ved thalassæmi) og forekomst af abnorme fraktioner (fx ved seglcelleanæmi).

Godkendt: 01-08-2007

