

**P - IgE, Specifikt i3-Hvepsegift (Vespula spp.)** Arbitrær stofkonc. (kua/L)

NPU 10 984; Hvepsestik, allergi

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Indikation</b>        | Mistanke om allergi mod hvepsegift.   |
| <b>Prøvemateriale</b>    | Blod i EDTA-, heparin- eller glas uden antikoagulans (tørglas)  |
| <b>Analysemateriale</b>  | 3 ml plasma eller serum (50 µl pr allergen)   |
| <b>Forsendelse</b>       | Afpipetteret plasma eller serum med almindelig post   |
| <b>Holdbarhed</b>        | Nogle døgn ved 20°C; 1 uge ved 4°C; 1 - 2 år ved -20°C  |
| <b>Laboratorium</b>      | Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg   |
| <b>Svartid</b>           | 1 - 4 dage  |
| <b>Referenceinterval</b> | < 0,35 kua/L  |
| <b>Bemærkninger</b>      | Der er krydsreaktivitet mellem giften fra honningbi og hveps m fl, hvilket kan påvirke den diagnostiske specificitet. |

Godkendt: 01-08-2007

