

**P - Lamotrigen**Stofkoncentration ( $\mu\text{mol/L}$ )

NPU 08 732; Lamictal

<b>Indikation</b>	Terapikontrol, 1. gang efter 1 uge efter påbegyndt behandling.
<b>Patientforberedelse</b>	Patienten skal instrueres om at vente med morgenmedicinen, indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
<b>Analysemateriale</b>	1 ml serum
<b>Forsendelse</b>	Afpipetteret serum med almindelig post
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade
<b>Svartid</b>	1 - 3 dage
<b>Terapeutisk interval</b>	Dalværdi lige før morgendosis 10 - 30 $\mu\text{mol/L}$
<b>Fortolkning</b>	Steady state opnås ca 5 døgn efter påbegyndt medicinering eller ændring i dosis. Hvis der tillægges anden antiepileptisk behandling, bør P-Lamotrigen kontrolleres efter 2 uger på grund af andre lægemidlers indvirkning på metabolismen (se Lægemiddelkataloget).

Godkendt: 01-08-2007

