

P - Leukocyt antistoffer

Arbitrær enhed (arb.enh.)

NPU 04 130

Indikation

Undersøgelsen anvendes i udredningen af årsager til transfusionsreaktioner, samt i forbindelse med transplantation og i udredningen af årsager til leukocytopeni og trombocytopeni. Kontakt eventuelt vagthavende læge på Klinisk Immunologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, med henblik på indikation for undersøgelse og hjælp til fortolkning af resultaterne.

Prøvemateriale

Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)

Prøven skal forsynes med dato, patientens navn og CPR-nr. Hvis analysen rekvireres i forbindelse med en transfusionsreaktion, skal prøverne også mærkes med tidspunkt i forhold til transfusionen (eventuelt blot "Før" og "Efter").

Analysemateriale

9 ml blod eller 3 ml serum

Forsendelse

Blod eller afpipetteret serum med almindelig post

Holdbarhed

2 døgn ved 4°C

Laboratorium

Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Rekvissionseddel

Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby:
Blodtypelaboratoriet, Vævstypelaboratoriet

Referenceinterval

0 arb.enh.

Fortolkning

Undersøgelsen anvendes i udredningen af årsager til transfusionsreaktioner, samt i forbindelse med transplantation og i udredningen af årsager til leukocytopeni og trombocytopeni. Kontakt eventuelt vagthavende læge på Klinisk Immunologisk afdeling, Århus Univesitetshospital, Skejby, med henblik på indikation for undersøgelse og hjælp til fortolkning af resultaterne.

Godkendt: 01-08-2007

