

**P - Parietalcelle antistoffer**

Arbitrær enhed (arb.enh.)

NPU 12 557; PCA; anti-HK-ATPase

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Indikation</b>        | Formodning om pernicios anæmi, nærmere undersøgelse ved kronisk atrofisk gastritis og autoimmun polyendokrinopati.   |
| <b>Prøvemateriale</b>    | Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)   |
| <b>Analysemateriale</b>  | 7 ml blod eller 3 ml serum<br>7 ml blod eller 3 ml serum er tilstrækkeligt, uanset om der rekvireres én eller flere undersøgelser. Overskydende serum nedfryses, så supplerende undersøgelser kan rekvireres efterfølgende.  |
| <b>Forsendelse</b>       | Blod eller afpipetteret serum med almindelig post  |
| <b>Laboratorium</b>      | Statens Serum Institut, København  |
| <b>Svartid</b>           | 3 - 4 dage   |
| <b>Referenceinterval</b> | 0 arb.enh.   |
| <b>Fortolkning</b>       | <p>Analysen er positiv med følgende hyppigheder: Pernicios anæmi ca 85 %, Hashimotos thyreoiditis 25 %, primært myksødem 25 %, thyreotoksidose 25 %. Den er hyppigt positiv ved atrofisk akylik gastritis, inden der er udviklet tegn på pernicios anæmi. Antistofferne forsvinder ved lang varighed af sygdommen.</p> <p>Analysen er positiv hos ca 6 % af raske personer og hyppigere hos familiemedlemmer til patienter med pernicios anæmi (20 - 30 %).</p> <p>Se evt.: <a href="http://www.ssi.dk">www.ssi.dk</a></p> |
| <b>Bemærkninger</b>      | Antistofferne er primært rettet mod syrepumpemolekyler i parietalcellerne (H + K + ATPase).  |

Godkendt: 01-08-2007

