

P - Parotitis virus antistof

Arbitrær stofkonc.

NPU 03 952 og 03 953; Fåresyge antistoffer

Indikation	Formodning om infektion med parotitisvirus (fåresyge), fx ved meningitis. Bestemmelse af Parotitis-immunstatus.
Patientforberedelse	Prøvetagning så tidligt i sygdomsforløbet som muligt
Prøvemateriale	Cerebrospinalvæske og blod uden antikoagulans
Analysemateriale	5 ml blod uden tilsætning og eventuelt 1 ml cerebrospinalvæske Ved formodning om meningitis pga parotitisvirus anbefales indsendt både spinalvæske og blod/serum
Forsendelse	Blod eller afpipetteret serum med almindelig post
Laboratorium	Statens Serum Institut, København
Svartid	Ca 7 dage
Referenceinterval	Se svar
Fortolkning	<p>IgM resultatet er positivt med høj titer allerede på 1. sygdomsdag ved akut infektion med parotitisvirus. IgG resultatet bliver positivt noget senere. Efter sygdommen bliver resultatet negativt for IgM i løbet af < 8 måneder og for IgG antistof efter mange år.</p> <p>IgM og /eller IgG er forhøjet i spinalvæske ved akut meningitis pga parotitisvirus.</p> <p>Se evt.: www.ssi.dk</p>
Bemærkninger	Separat påvisning af IgG og IgM antistof. Hvert resultat angives som negativt eller positivt.

Godkendt: 01-08-2007

