

**P - Varicella-Zoster virus antistof**

Arbitrær enhed (arb.enh.)

NPU 03 742; VZV-antistoffer; Skoldkopper; Helvedesild

<b>Indikation</b>	Formodning om primær infektion (varicella) eller reaktivering (zoster).
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
<b>Analysemateriale</b>	4 ml blod eller 1 ml serum
<b>Forsendelse</b>	Blod eller afpipetteret serum med almindelig post
<b>Holdbarhed</b>	2 døgn ved 4°C; flere år ved -20°C
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
<b>Rekvissionseddel</b>	Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby: Virologisk afsnit (blå seddel i A5-format)
<b>Svartid</b>	2 - 4 dage
<b>Fortolkning</b>	<p>Det anbefales at tage en blodprøve så tidligt som muligt i sygdomsforløbet og evt en ny prøve 2 - 3 uger senere.</p> <p>En titerstigning med en faktor 4 eller mere tages almindeligvis som udtryk for en aktuel infektion.</p> <p>Hvis der kun er taget én prøve, tyder en titer &gt; 12.800 på en aktuel eller nylig zoster. Ved reaktiveret infektion stiger titeren typisk mere end 2 gange.</p> <p>Se i øvrigt besvarelse fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.</p>

Godkendt: 01-08-2007

