


Vejledning til sundhedspersonale

Randersmodellen for patienter med hoftenær fraktur i ugerne efter udskrivelse fra Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

FOKUSOMRÅDE	UDSKR.DAGEN	UGE 1 EFTER UDSKR	UGE 2 EFTER UDSKR
TOBS Ved TOBS forhøjelse ≥ 2: <ul style="list-style-type: none"> Tjek cicatrice før kontakt til sengeafsnittet Tænk over eventuelle infektionsfoci ved temp forhøjelse. 	TOKS før udskrivning TOBS aften Ved TOKS ≥ 2 kontakt sengeafsnittet	TOBS i dagvagten og derefter ifølge algoritmen Ved TOBS ≥ 2 kontakt sengeafsnittet	TOBS i dagvagten og derefter ifølge algoritmen Ved TOBS ≥ 2 kontakt sengeafsnittet
Smerte Ved smerter VAS/NRS ≥ 3: <ul style="list-style-type: none"> Se flowchart 	Smertescreening dgl. Obs aftrapning/udtrapning	Smertescreening dgl	Smertescreening dgl
Mobilisering	Mobiliseres til stol hver dag + i forbindelse med dgl. gøremål/hygiejne/ måltider	Mobiliseres til stol hver dag + i forbindelse med dagl gøremål/hygiejne/ måltider	Mobiliseres til stol hver dag + i forbindelse med dagl gøremål/hygiejne/ måltider
Udskillelser Se flowchart	Registrere afføringsmønster og observere vandladningsmønster, hvis muligt	Registrere afføringsmønster og observere vandladningsmønster, hvis muligt	Registrere afføringsmønster og observere vandladningsmønster, hvis muligt


Hvis patienten udskrives med TOBS ≥ 2 se udskrivningsrapport fra hospitalet.

Udskillelse



Smerter

VAS/NRS



VAS/NRS

